

Mycorrcin | Trang kỹ thuật

Cây trồng



Cách hoạt động của Mycorrcin

Mycorrcin là chất kích thích sinh học trong đất, kích hoạt các vi sinh vật tự nhiên có lợi trong trồng để cải thiện sức khỏe cây trồng, khả năng phục hồi và phát triển rễ.

Kích hoạt các vi sinh vật trong đất kích thích sự phát triển của rễ mới và phân nhánh, cũng như khuyến khích sự liên kết của nấm rễ với rễ cây, dẫn đến sự hình thành tốt hơn của cây. Sự kích thích của các vi sinh vật trong đất cũng dẫn đến cải thiện về khả năng cung cấp và hấp thụ chất dinh dưỡng của cây, bao gồm canxi và photphat.

Có hệ sinh học đất lành mạnh trong vùng rễ cây (thân rễ) sẽ kích thích “hệ thống miễn dịch” của cây thông qua việc kích hoạt khả năng kích kháng (ISR) giúp cây có năng lực phục hồi trong giai đoạn hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt. Về lâu dài, việc có hệ vi sinh trong đất tốt hơn sẽ dẫn đến sự hình thành kết tụ của đất, làm giảm độ nén của đất.

Mycorrcin có thể được sử dụng cho tất cả các loại rau trồng ngoài đồng ruộng, thủy canh và cây trồng trong thùng chứa.

Lợi ích sử dụng Mycorrcin

- Kích hoạt các vi sinh vật có lợi trong đất bao gồm nấm rễ
- Kích thích sự phát triển của rễ mới và phân nhánh
- Cải thiện sự hình thành và khả năng phục hồi của cây, giảm sốc khi cấy ghép.
- Khắc phục sự cố nén đất bằng cách thay đổi sự hình thành của đất
- Tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Hướng dẫn sử dụng

- Phun Mycorrcin trực tiếp lên đất để kích hoạt hoạt động của vi sinh vật trong đất
- Để đạt hiệu quả, Mycorrcin cần độ ẩm của đất/mưa và hoạt động sinh học của đất
- Mycorrcin có thể được trộn trong bể với thuốc diệt cỏ, diệt nấm, chất dinh dưỡng bón phân và phân bón huyền phù
- Mycorrcin có thể được áp dụng thông qua các hệ thống tưới phân bón và tưới tiêu trên cao được trang bị thích hợp
- Đối với đất ít chất hữu cơ và / hoặc đất có độ phì nhiêu thấp, hãy thường xuyên sử dụng Mycorrcin với lượng nhỏ hơn thông qua hệ thống tưới phân bón hoặc hệ thống tưới tiêu
- Để có kết quả tốt nhất, tránh sử dụng Mycorrcin vào thời điểm có nhiệt độ cao ban ngày.

Liều lượng sử dụng cho rau củ

Cây trồng	Cách thức sử dụng
Khoai tây	Bón 8 L/ha theo rãnh khi trồng
Hành tây	Bón 6 L / ha vào đất ẩm khi có lá thật đầu tiên trước khi mưa
Chi Cải	Khi cấy, ngâm cây con trong 1 phần Mycorrcin với 100 phần nước. Bón 6 L/ha vào đất trước hoặc ngay sau khi trồng
Rau diếp	Khi cấy, ngâm cây con trong 1 phần Mycorrcin với 100 phần nước. Bón 6 L/ha vào đất trước hoặc ngay sau khi trồng
Bí đao	Bón 6 L/ha vào đất trước hoặc ngay sau khi trồng
Bắp ngọt	Bón 4 L/ha vào đất trước hoặc ngay sau khi trồng
Cà rốt	Bón 6 L/ha vào đất từ khi mọc đến khi có lá thật thứ hai